

1

**Adapté (précautions standard')**

Il est recommandé de faire une friction des mains (FHA) immédiatement avant tout contact direct avec le patient et de porter des gants lors de contact avec les liquides biologiques et les muqueuses.

2

**Non adapté (précautions standard)**

L'aide-soignant aurait dû changer de gants pour vider chaque poche à urines. Il est recommandé de faire une friction avant et après le port de gants.

3

**Non adapté (précautions standard)**

Le kinésithérapeute aurait dû jeter les gants après l'expectoration, faire une friction puis régler l'aérosol à mains nues. Il est recommandé d'enlever les gants et de faire une friction après chaque soin avant de toucher l'environnement.

4

**Adapté (précautions complémentaires contact)**

Il est recommandé de faire une friction des mains (FHA) immédiatement avant et après contact direct avec le patient. Le port de gants n'est pas indiqué lors des contacts avec la peau saine du patient qu'il soit ou non porteur de Bactérie Multi Résistante.

5

**Non adapté (précautions standard)**

L'infirmière aurait dû jeter les gants et faire une friction des mains (FHA) entre le soin de pansement/plaie et la pose de CVP. Une friction est recommandée entre tout soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient afin de limiter le risque de transmission de microorganismes.

6

**Non adapté (précautions standard)**

Il est recommandé de faire une friction des mains avant tout contact direct avec le patient. le port de gants n'est pas recommandé lors du contact avec la peau saine.

7

**Adapté (précautions standard)**

Il est recommandé de faire une friction des mains (FHA) après le dernier contact direct ou soin auprès d'un patient. Il n'y a pas d'indication de port de gants lors des contacts avec la peau saine.

8

**Non adapté (situations spécifiques)**

Après tout soin à un patient porteur de la gale et/ou de *Clostridium difficile*, il est impératif de faire un lavage simple des mains (action mécanique pour éliminer parasites et spores bactériennes) suivi d'une friction des mains (FHA) sur des mains correctement séchées.

9

**Non adapté (précautions standard)**

Il est recommandé de faire une friction des mains avant la pose d'un CVP, par contre l'anesthésiste aurait dû porter des gants car l'utilisation de matériel de sécurité ne dispense pas du port de gants. (Prévention des Accidents Exposant au Sang)

10

**Adapté (précautions standard)**

Il est recommandé de faire une friction des mains (FHA) immédiatement avant tout soin et de porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec la peau lésée.

**Votre score : nombre de bonnes réponses ...../10**

- 10 réponses exactes : vous méritez « **les mains d'or** »
- 7 à 9 réponses exactes : vous obtenez « **les mains d'argent** »
- Moins de 7 bonnes réponses : profitez des animations- démonstrations organisées dans votre établissement, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'EOHH, des correspondants en hygiène et à consulter le blog du ministère

<sup>1</sup> Circulaire DGS/DH – n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé